

# El Cogollero del Maíz

*(Espodóptera Frugiperda)*

Una de las plagas que causan mayores daños económicos en el cultivo del maíz es el gusano cogollero del maíz. Es importante identificarla en campo para lograr controlarla.

## DAÑOS A LA PLANTA



**Como trozador,** corta las plántulas de maíz a nivel del suelo. Una de las prácticas preventivas es aplicar tratadores de semillas de amplio espectro para control de plagas de suelo y follaje, puede ser un producto que contenga Emamectin Benzoato (Cepadik).



**Como Cogollero,** ya es una larva más desarrollada que puede llegar a provocar la defoliación de la planta, debora el follaje de afuera hacia adentro, rasgando y haciendo huecos en las hojas y en el cogollo. El daño económico que puede causar es de hasta un 40%.



**Como barrenador,** afectando los tallos de plantas pequeñas dando resultado el síntoma de corazón muerto. Este puede llegar a afectar hasta un 10% de las plantas.



**Como elotero,** ataca la mazorca dañando los estigmas (que son los pelos de la mazorca) y los granos.

## RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

1

ROTACIÓN DE CULTIVOS

2

REALIZAR INCORPORACIÓN AL SUELO Y ELIMINAR RESIDUOS DE COSECHAS ANTERIORES

3

CONTROL DE MALEZAS

4

UTILIZAR PRODUCTOS, DOSIS Y APLICACIONES ADECUADAS

*El control más eficiente se logra con la aplicación de insecticidas, que pueden ser a base de Emamectin Benzoato, en los primeros estadios de la larva.*